





後発品		標準品		
商品名	ピタバスタチンCa錠2mg「科研」	リバコ錠2mg		
販売会社名	科研製薬株式会社			
規格「一般名」	1錠中ピタバスタチンカルシウムを2mg含有			
薬効分類	218 高脂血症用剤			
薬価	17.80円/1錠	42.40円/1錠		
1錠薬価差	24.60円			
効能・効果	高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症 【標準品と同じ】			
用法・用量	高コレステロール血症 通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1~2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。 家族性高コレステロール血症 成人：通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1~2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。 小児：通常、10歳以上の小児にはピタバスタチンカルシウムとして1mgを1日1回経口投与する。 なお、症状により適宜増減し、KDk-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日2mgまでとする。 【標準品と同じ】			
添加物	D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム、黄色三酸化鉄、ヒメロース、マクロゴール6000、その他1成分	乳糖水和物、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、クエン酸トリエチル、含水二酸化ケイ素、酸化チタン、カルナウバロウ、黄色五号		
規制区分	処方箋医薬品	処方箋医薬品		
貯法・使用期限	気密容器、遮光、室温保存 3年			
製剤	商品名	外観(重量、直径、厚さ)	性状	識別コード
	ピタバスタチンCa錠2mg「科研」	 126mg 7.1mm 3.1mm	白色の割線入りフィルムコーティング錠	DK521
標準品	 125mg 7.1mm 2.9mm	ごくうすい黄赤色・割線入りフィルムコーティング錠		
製剤特性	特になし			
薬物動態(生物学的同等性)	血漿中濃度比較試験 (ng/mL) 血漿中未変化体濃度  時間 (hr)		溶出試験 溶出試験結果(pH1.2/50rpm)  試験液採取時間(分)	
	クロスオーバー法により各1錠を絶食単回経口投与し、生物学的に同等と判定された。		溶出試験結果(pH6.8/50rpm)  試験液採取時間(分)	
備考	両製剤の溶出挙動はいずれの試験液においても同等と判定された。			
担当者、連絡先				