おくすりガイド　（2026 年 11 月作成）

薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。
医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。
薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

オパルモン錠

一般名　： リマプロスト　アルファデクス （Limaprost Alfadex）

販売名	オパルモン 錠 5μg
形状（製剤 写真 等）	

1. どんな薬

○この薬は、血管の拡張作用や血流の増加作用、血が固まることを抑える作用があります。血が不足することによる痛みや潰瘍、冷感、あるいは神経が圧迫されることによる足の痛みやしびれ、歩きにくさをやわらげます。[経口 プロスタグランジン E_1 誘導体 製剤]

2. この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

🚫 **次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。**

・妊婦 または 妊娠 している可能性のある人

○**次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。**

・出血傾向のある人

・授乳中の人

○この薬には一緒に使用する場合に注意が必要な薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

―

4. ほかに知られている副作用

比較的 よくみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用
皮ふにできたできものや傷	発疹
お腹が痛い、水のような便が出る、泥のようなゆるい便が出る	下痢
ドキドキする、脈が速くなる	心悸亢進

5. 保管方法

直射日光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

6. 問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。
この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。
製造販売業者：ダイト株式会社（https://www.daitonet.co.jp/）

販売会社：科研製薬株式会社（https://www.kaken.co.jp/）医薬品情報サービス室、電話：0120-519-874、受付時間：9 時～17 時（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。
制度の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html