

メトトレキサート製剤の報告副作用

ダイト株式会社

製品名	メトトレキサート錠2mg「ダイト」(販売開始:2018年6月)																									
有効成分	メトトレキサート																									
報告副作用	<p>自社品でのPMDA報告副作用(重篤症例)につきましては下記の通りです。</p> <p>医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。</p> <p>2025年4月1日現在</p> <p>報告副作用 1件</p> <table> <tr> <th></th><th>報告年度</th><th>性別</th><th>年齢</th><th>原疾患等</th><th>被疑薬</th><th>有害事象</th><th>併用被疑薬</th><th>転帰</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2023</td><td>女</td><td>70歳代</td><td>リウマチ疑い、 腎不全</td><td>メトトレキサート錠 2mg「ダイト」</td><td>ステイブンス・ ジョンソン 症候群</td><td>プレドニゾ ン、葉酸</td><td>軽快</td></tr> </table>									報告年度	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	有害事象	併用被疑薬	転帰	1	2023	女	70歳代	リウマチ疑い、 腎不全	メトトレキサート錠 2mg「ダイト」	ステイブンス・ ジョンソン 症候群	プレドニゾ ン、葉酸	軽快
	報告年度	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	有害事象	併用被疑薬	転帰																		
1	2023	女	70歳代	リウマチ疑い、 腎不全	メトトレキサート錠 2mg「ダイト」	ステイブンス・ ジョンソン 症候群	プレドニゾ ン、葉酸	軽快																		