

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2018（2019年更新版）に準拠して作成

HMG-CoA 還元酵素阻害剤	
日本薬局方 ロスバスタチンカルシウム錠	
ロスバスタチン錠2.5mg「科研」	
ロスバスタチン錠5mg「科研」	
ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	
ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	
Rosuvastatin Tablets / OD Tablets	

剤形	錠 2.5mg、錠 5mg : フィルムコーティング錠 OD 錠 2.5mg、OD 錠 5mg : フィルムコーティング錠（口腔内崩壊錠）
製剤の規制区分	処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）
規格・含量	錠 2.5mg、OD 錠 2.5mg : 1錠中 日局ロスバスタチンカルシウム 2.6mg （ロスバスタチンとして 2.5mg） 錠 5mg、OD 錠 5mg : 1錠中 日局ロスバスタチンカルシウム 5.2mg （ロスバスタチンとして 5mg）
一般名	和名：ロスバスタチンカルシウム（JAN） 洋名：Rosuvastatin Calcium（JAN）
製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 販売開始年月日	製造販売承認年月日：2017年8月15日 薬価基準収載年月日：2017年12月8日 販売開始年月日：2017年12月8日
開発・製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	発売元：科研製薬株式会社 製造販売元：ダイト株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	科研製薬株式会社 医薬品情報サービス室 T E L : 0120-519-874 受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く） ホームページアドレス： https://www.kaken.co.jp/

本IFは2023年7月改訂（第2版）の添付文書の記載に基づき作成した。

最新の情報は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認して下さい。

医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要 －日本病院薬剤師会－

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として、医療用医薬品添付文書（以下、添付文書）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合があり、製薬企業の医薬情報担当者（以下、MR）等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム（以下、IF と略す）が誕生した。

1988年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬）学術第2小委員会がIFの位置付け、IF記載様式、IF記載要領を策定し、その後1998年に日病薬学術第3小委員会が、2008年、2013年に日病薬医薬情報委員会がIF記載要領の改訂を行ってきた。

IF記載要領2008以降、IFはPDF等の電子的データとして提供することが原則となった。これにより、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加したIFが速やかに提供されることとなった。最新版のIFは、医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）の医療用医薬品情報検索のページ（<http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>）にて公開されている。日病薬では、2009年より新医薬品のIFの情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討会」を設置し、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討している。

2019年の添付文書記載要領の変更に合わせて、「IF記載要領2018」が公表され、今般「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定した。

2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、医師・薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

IFに記載する項目配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、利用者自らが評価・判断・臨床適用するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。IFの提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。

3. IFの利用にあたって

電子媒体のIFは、PMDAの医療用医薬品情報検索のページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従ってIFを作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより利用者自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、製薬企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等、あるいは各種の医薬品情報提供サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書をPMDAの医薬品医療機器情報検索のページで確認する必要がある。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「V.5. 臨床成績」や「XII. 参考資料」、 「XIII. 備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり、その取り扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IFを日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用していただきたい。IFは日病薬の要請を受けて、当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する、医薬品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが、記載・表現には医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の広告規則や販売情報提供活動ガイドライン、製薬協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイドラインでは、未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について、製薬企業が医療従事者からの求めに応じて行うことは差し支えないとされており、MR等へのインタビューや自らの文献調査などにより、利用者自らがIFの内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければならない。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場における適正使用を確保することは薬剤師の本務であり、IFを利用して日常業務を更に価値あるものにしていただきたい。

(2020年4月改訂)

目次

I. 概要に関する項目	1	(3) 予備容量	10
1. 開発の経緯	1	(4) 容器の材質	10
2. 製品の治療学的特性	1	11. 別途提供される資材類	10
3. 製品の製剤学的特性	1	12. その他	10
4. 適正使用に関して周知すべき特性	1	V. 治療に関する項目	11
5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項	1	1. 効能又は効果	11
(1) 承認条件	1	2. 効能又は効果に関連する注意	11
(2) 流通・使用上の制限事項	1	3. 用法及び用量	11
6. RMP の概要	1	(1) 用法及び用量の解説	11
II. 名称に関する項目	2	(2) 用法及び用量の設定経緯・根拠	11
1. 販売名	2	4. 用法及び用量に関連する注意	11
(1) 和名	2	5. 臨床成績	11
(2) 洋名	2	(1) 臨床データパッケージ	11
(3) 名称の由来	2	(2) 臨床薬理試験	11
2. 一般名	2	(3) 用量反応探索試験	11
(1) 和名(命名法)	2	(4) 検証的試験	12
(2) 洋名(命名法)	2	(5) 患者・病態別試験	13
(3) ステム(stem)	2	(6) 治療的使用	13
3. 構造式又は示性式	2	(7) その他	13
4. 分子式及び分子量	2	VI. 薬効薬理に関する項目	14
5. 化学名(命名法)又は本質	2	1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	14
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	2	2. 薬理作用	14
III. 有効成分に関する項目	3	(1) 作用部位・作用機序	14
1. 物理化学的性質	3	(2) 薬効を裏付ける試験成績	14
(1) 外観・性状	3	(3) 作用発現時間・持続時間	14
(2) 溶解性	3	VII. 薬物動態に関する項目	15
(3) 吸湿性	3	1. 血中濃度の推移	15
(4) 融点(分解点)、沸点、凝固点	3	(1) 治療上有効な血中濃度	15
(5) 酸塩基解離定数	3	(2) 臨床試験で確認された血中濃度	15
(6) 分配係数	3	(3) 中毒域	18
(7) その他の主な示性値	3	(4) 食事・併用薬の影響	18
2. 有効成分の各種条件下における安定性	3	2. 薬物速度論的パラメータ	19
3. 有効成分の確認試験法, 定量法	3	(1) 解析方法	19
IV. 製剤に関する項目	4	(2) 吸収速度定数	19
1. 剤形	4	(3) 消失速度定数	19
(1) 剤形の区別	4	(4) クリアランス	19
(2) 製剤の外観及び性状	4	(5) 分布容積	19
(3) 識別コード	4	(6) その他	19
(4) 製剤の物性	4	3. 母集団(ポピュレーション)解析	19
(5) その他	4	(1) 解析方法	19
2. 製剤の組成	5	(2) パラメータ変動要因	19
(1) 有効成分(活性成分)の含量及び添加剤	5	4. 吸収	19
(2) 電解質等の濃度	5	5. 分布	19
(3) 熱量	5	(1) 血液-脳関門通過性	19
3. 添付溶解液の組成及び容量	5	(2) 血液-胎盤関門通過性	20
4. 力価	5	(3) 乳汁への移行性	20
5. 混入する可能性のある夾雑物	5	(4) 髄液への移行性	20
6. 製剤の各種条件下における安定性	6	(5) その他の組織への移行性	20
7. 調製法及び溶解後の安定性	6	(6) 血漿蛋白結合率	20
8. 他剤との配合変化(物理化学的变化)	6	6. 代謝	20
9. 溶出性	6	(1) 代謝部位及び代謝経路	20
10. 容器・包装	10	(2) 代謝に関与する酵素(CYP等)の分子種, 寄与率	20
(1) 注意が必要な容器・包装, 外観が特殊な容器・包装に関する情報	10	(3) 初回通過効果の有無及びその割合	20
(2) 包装	10		

(4) 代謝物の活性の有無及び活性比, 存在比率	20	7. 国際誕生年月日	29
7. 排泄	20	8. 製造販売承認年月日及び承認番号, 薬価基準収載年月日, 販売開始年月日	29
(1) 排泄部位及び経路	20	9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等 の年月日及びその内容	30
(2) 排泄率	20	10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及び その内容	30
(3) 排泄速度	21	11. 再審査期間	30
8. トランスポーターに関する情報	21	12. 投薬期間制限に関する情報	30
9. 透析等による除去率	21	13. 各種コード	30
10. 特定の背景を有する患者	21	14. 保険給付上の注意	30
11. その他	21	XI. 文献	31
VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目	22	1. 引用文献	31
1. 警告内容とその理由	22	2. その他の参考文献	32
2. 禁忌内容とその理由	22	XII. 参考資料	33
3. 効能又は効果に関連する注意とその理由	22	1. 主な外国での発売状況	33
4. 用法及び用量に関連する注意とその理由	22	2. 海外における臨床支援情報	33
5. 重要な基本的注意とその理由	22	XIII. 備考	34
6. 特定の背景を有する患者に関する注意	22	1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を 行うにあたっての参考情報	34
(1) 合併症・既往歴等のある患者	22	(1) 粉碎	34
(2) 腎機能障害患者	23	(2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの 通過性	34
(3) 肝機能障害患者	23	2. その他の関連資料	34
(4) 生殖能を有する者	23	(1) 患者向け説明用資材	34
(5) 妊婦	23	(2) GS1 コード	34
(6) 授乳婦	23		
(7) 小児等	23		
(8) 高齢者	23		
7. 相互作用	24		
(1) 併用禁忌とその理由	24		
(2) 併用注意とその理由	24		
8. 副作用	25		
(1) 重大な副作用と初期症状	26		
(2) その他の副作用	26		
9. 臨床検査結果に及ぼす影響	26		
10. 過量投与	26		
11. 適用上の注意	27		
12. その他の注意	27		
(1) 臨床使用に基づく情報	27		
(2) 非臨床試験に基づく情報	27		
IX. 非臨床試験に関する項目	28		
1. 薬理試験	28		
(1) 薬効薬理試験	28		
(2) 安全性薬理試験	28		
(3) その他の薬理試験	28		
2. 毒性試験	28		
(1) 単回投与毒性試験	28		
(2) 反復投与毒性試験	28		
(3) 遺伝毒性試験	28		
(4) がん原性試験	28		
(5) 生殖発生毒性試験	28		
(6) 局所刺激性試験	28		
(7) その他の特殊毒性	28		
X. 管理的事項に関する項目	29		
1. 規制区分	29		
2. 有効期間	29		
3. 包装状態での貯法	29		
4. 取扱い上の注意	29		
5. 患者向け資材	29		
6. 同一成分・同効薬	29		

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

ロスバスタチンカルシウムは、HMG-CoA還元酵素阻害剤に分類される高脂血症治療剤であり、本邦においては2005年に上市され、広く臨床で使用されている。

ロスバスタチン錠 2.5mg「科研」、同錠 5mg「科研」及びロスバスタチン OD 錠 2.5mg「科研」、同 OD 錠 5mg「科研」は、ロスバスタチンカルシウムを主成分とする後発医薬品としてダイト株式会社が開発を企画し、薬食発 1121 第 2 号（平成 26 年 11 月 21 日）に基づき、規格及び試験方法を設定、加速試験、生物学的同等性試験を実施し、2017 年 8 月に製造販売承認を取得した。

なお、ロスバスタチンカルシウム及びロスバスタチンカルシウム錠は第十八改正日本薬局方に収載された。

2. 製品の治療学的特性

- (1) ロスバスタチンカルシウムは、肝臓内に能動的に取り込まれ、肝臓でのコレステロール生合成系の律速酵素である HMG-CoA 還元酵素を選択的かつ競合的に阻害し、コレステロール生合成を強力に抑制する。その結果、肝臓内のコレステロール含量が低下し、これを補うため LDL 受容体の発現が誘導される。この LDL 受容体を介して、コレステロール含有率の高いリポ蛋白である LDL の肝臓への取り込みが増加し、血中コレステロールが低下する。ロスバスタチンカルシウムは、肝臓では主として能動輸送系を介して取り込まれ、脂質親和性が比較的低いため、能動輸送系を持たない他の臓器には取り込まれにくく、肝特異的な HMG-CoA 還元酵素阻害剤であると考えられる（「VI. 薬効薬理に関する項目」、「V. 治療に関する項目」参照）。
- (2) 重大な副作用として、横紋筋融解症、ミオパチー、免疫介在性壊死性ミオパチー、肝炎、肝機能障害、黄疸、血小板減少、過敏症状、間質性肺炎、末梢神経障害、多形紅斑が報告されている。（「VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目」参照）

3. 製品の製剤学的特性

- (1) 錠剤には識別性向上のため「製品名」、「含量」を印字している。
- (2) ロスバスタチン OD 錠 2.5mg・5mg「科研」は水なしでも服用可能な口腔内崩壊錠であり、フィルムコーティング錠とすることで光安定性が向上している。
- (3) PTP シートはピッチ印刷の採用により 1 錠単位で「製品名」、「含量」を判りやすく表示しており、PTP シート裏面は視認性を高めるため白地にして GS-1 コードを表示している。

4. 適正使用に関して周知すべき特性

適正使用に関する資材 等	有無
RMP	無
追加のリスク最小化活動として作成されている資材	無
最適使用推進ガイドライン	無
保険適用上の留意事項通知	無

5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項

(1) 承認条件

該当しない

(2) 流通・使用上の制限事項

該当しない

6. RMP の概要

該当しない

II. 名称に関する項目

1. 販売名

(1) 和 名

ロスバスタチン錠 2.5mg 「科研」
ロスバスタチン錠 5mg 「科研」
ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」
ロスバスタチン OD 錠 5mg 「科研」

(2) 洋 名

Rosuvastatin Calcium Tablets 2.5mg 「KAKEN」
Rosuvastatin Calcium Tablets 5mg 「KAKEN」
Rosuvastatin Calcium OD Tablets 2.5mg 「KAKEN」
Rosuvastatin Calcium OD Tablets 5mg 「KAKEN」

(3) 名称の由来

「有効成分名」 + 「剤形」 + 「規格」 + 「屋号」 より命名。

2. 一般名

(1) 和 名 (命名法)

ロスバスタチンカルシウム (JAN)


(2) 洋 名 (命名法)

Rosuvastatin Calcium (JAN, INN)

(3) ステム (stem)

-vastatin (HMG-CoA 還元酵素阻害作用を有する高脂血症治療剤)

3. 構造式又は示性式



4. 分子式及び分子量

分子式 : $(C_{22}H_{27}FN_3O_6S)_2Ca$

分子量 : 1001.14

5. 化学名 (命名法) 又は本質

Monocalcium bis[(3*R*,5*S*,6*E*)-7- {4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2- [methyl (methylsulfonyl) aminol]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate] (IUPAC)

6. 慣用名、別名、略号、記号番号

CAS 登録番号 : 287714-41-4(rosuvastatin)

147098-20-2(rosuvastatin calcium)

III. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色の粉末である。

(2) 溶解性

溶 媒	1gを溶かすのに要する溶媒量	日本薬局方の溶解度表記
アセトニトリル	1mL以上 10mL未満	溶けやすい
メタノール	10mL以上 30mL未満	やや溶けやすい
水、エタノール (95)	10,000mL以上	溶けにくい

(3) 吸湿性

本品は吸湿性である。

(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点

該当資料なし

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

該当資料なし

2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法， 定量法

確認試験法

日本薬局方「ロスバスタチンカルシウム」の確認試験法による。

- ・紫外可視吸光度測定法
- ・赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法）
- ・カルシウム塩の定性反応（3）

定量法

日本薬局方「ロスバスタチンカルシウム」の定量法による。

- ・液体クロマトグラフィー

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別

フィルムコーティング錠

(2) 製剤の外観及び性状

販売名	ロスバスタチン錠 2.5mg 「科研」			ロスバスタチン錠 5mg 「科研」		
色	白色から帯黄白色			白色から帯黄白色		
形状	表 	裏 	側面 	表 	裏 	側面
直径	6.1mm			7.1mm		
厚さ	2.5mm			3.6mm		
質量	80mg			158mg		

販売名	ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」			ロスバスタチン OD 錠 5mg 「科研」		
色	うすい黄色			うすい黄色		
形状	表 	裏 	側面 	表 	裏 	側面
直径	5.6mm			7.2mm		
厚さ	3.1mm			3.6mm		
質量	77.5mg			154mg		

(3) 識別コード

該当しない

(4) 製剤の物性

[ロスバスタチン錠 2.5mg 「科研」、同錠 5mg 「科研」]
該当資料なし

[ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」、同 OD 錠 5mg 「科研」]

崩壊性：日局一般試験法

崩壊試験法の「即放性製剤」の項により試験を行うとき、1分以内に崩壊する。

(5) その他

該当資料なし

2. 製剤の組成

(1) 有効成分（活性成分）の含量及び添加剤

販売名	ロスバスタチン錠 2.5mg 「科研」	ロスバスタチン錠 5mg 「科研」
有効成分	1 錠中 日局ロスバスタチンカルシウム 2.6mg（ロスバスタチンとして 2.5mg）	1 錠中 日局ロスバスタチンカルシウム 5.2mg（ロスバスタチンとして 5.2mg）
添加剤	乳糖水和物、リン酸水素カルシウム水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、プロピレングリコール、酸化チタン、カルナウバロウ	

販売名	ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」	ロスバスタチン OD 錠 5mg 「科研」
有効成分	1 錠中 日局ロスバスタチンカルシウム 2.6mg（ロスバスタチンとして 2.5mg）	1 錠中 日局ロスバスタチンカルシウム 5.2mg（ロスバスタチンとして 5.2mg）
添加剤	D-マンニトール、炭酸水素ナトリウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、結晶セルロース、アミノアルキルメタクリレートコポリマーE、スクラロース、l-メントール、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、ステアリン酸マグネシウム	

(2) 電解質等の濃度

該当しない

(3) 熱量

該当しない



3. 添付溶解液の組成及び容量

該当しない

4. 力価

該当しない

5. 混入する可能性のある夾雑物

類縁物質名、化学式	構造式
5-ケト体 (3 <i>R</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-フルオロフェニル)-6-(1-メチルエチル)-2-[メチル(メチルスルホニル)アミノ]ピリミジン-5-イル]-3-ヒドロキシ-5-オキソヘプト-6-エン酸	
ラクトン体 <i>N</i> -(4-(4-フルオロフェニル)-5-[(<i>E</i>)-2-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-ヒドロキシ-6-オキソテトラヒドロ-2 <i>H</i> -ピラン-2-イル]エチル]-6-(1-メチルエチル)ピリミジン-2-イル)- <i>N</i> -メチルメタンサルホンアミド	

6. 製剤の各種条件下における安定性

[ロスバスタチン錠 2.5mg「科研」、同錠 5mg「科研」]

最終包装製品を用いた長期保存試験及び加速試験の結果、通常の流通過程で少なくとも3年間の品質保証は可能であると判断した¹⁾。

製品名	保存条件	包装形態	保存期間	結果 ^{※1}
ロスバスタチン錠 2.5mg「科研」	40±1℃ 75±5%RH	PTP包装	6ヵ月	規格内
ロスバスタチン錠 5mg「科研」	25±2℃ 60±5%RH	PTP包装	36ヵ月	規格内

※1 試験項目：性状、確認試験、純度試験、製剤均一性試験（含量均一性試験）、溶出性、定量

[ロスバスタチン OD 錠 2.5mg「科研」、同 OD 錠 5mg「科研」]

最終包装製品を用いた長期保存試験及び加速試験の結果、通常の市場流通下において2年間安定であることが推定された¹⁾。

製品名	保存条件	包装形態	保存期間	結果 ^{※2}
ロスバスタチン OD 錠 2.5mg「科研」	40±2℃ 75±5%RH	PTP包装	6ヵ月	規格内
ロスバスタチン OD 錠 5mg「科研」	25±2℃ 60±5%RH	PTP包装	18ヵ月	規格内

※2 試験項目：性状、確認試験、純度試験、製剤均一性試験（含量均一性試験）、崩壊性、溶出性、定量

7. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

8. 他剤との配合変化（物理化学的変化）

該当資料なし

9. 溶出性

[日本薬局方に基づく試験]

ロスバスタチン錠 2.5mg「科研」及びロスバスタチン錠 5mg「科研」は、日本薬局方医薬品各条に定められたロスバスタチンカルシウム錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

[後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（平成24年2月29日改正 薬食審査発0229第10号 別紙1）（錠5mg、OD錠5mg）、及び含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン（平成24年2月29日改正 薬食審査発0229第10号 別紙2）（錠2.5mg、OD錠2.5mg）に基づく試験]

(1) ロスバスタチン錠 5mg「科研」

①被験薬剤

試験製剤：ロスバスタチン錠 5mg「科研」

標準製剤：クレストール錠 5mg（1錠中にロスバスタチン 5mg を含有する錠剤）

②試験条件

試験法：日本薬局方一般試験法溶出試験法 パドル法

試験液量：900mL

測定方法：液体クロマトグラフィー


各種条件：

試験液	サンプリング時間（分）	回転数
pH1.2	5,10,15,30,45,60,90	50rpm
pH3.0	5,10,15,30,45,60,90,120,180	
pH6.8	5,10,15,30,45	
水	5,10,15,30,45	
pH3.0	5,10,15	100rpm
試験液温	37.0±0.5℃	
ベッセル数	12 ベッセル	


③試験結果：ロスバスタチン錠 5mg「科研」の溶出挙動は、いずれの試験液においても「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の基準の範囲内であり、試験製剤と標準製剤の溶出挙動は類似していると判断された²⁾。

[ロスバスタチン錠 5mg「科研」と標準製剤の各種条件下における溶出挙動]


pH1.2, 50rpm




pH3.0, 50rpm




pH6.8, 50rpm



水, 50rpm



pH3.0, 100rpm



(2) ロスバスタチン錠 2.5mg「科研」

①被験薬剤

試験製剤：ロスバスタチン錠 2.5mg「科研」

標準製剤：ロスバスタチン錠 5mg「科研」

②試験条件

試験法：日本薬局方一般試験法溶出試験法 パドル法

試験液量：900mL

測定方法：液体クロマトグラフィー


各種条件：

試験液	サンプリング時間 (分)	回転数
pH6.8	5,10,15,30,45	50rpm
試験液温	37.0±0.5℃	
ベッセル数	12 ベッセル	

IV. 製剤に関する項目

③試験結果：ロスバスタチン錠 2.5mg「科研」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、ロスバスタチン錠 5mg「科研」を標準製剤としたとき、全ての試験条件において溶出挙動が同等と判定されたため、生物学的に同等とみなされた²⁾。

[ロスバスタチン錠 2.5mg「科研」と標準製剤の各種条件下における溶出挙動]
pH6.8, 50rpm



(3) ロスバスタチン OD 錠 5mg「科研」

①被験薬剤

試験製剤：ロスバスタチン OD 錠 5mg「科研」

標準製剤：クレストール錠 5mg (1錠中にロスバスタチン 5mg を含有する錠剤)

②試験条件

試験法：日本薬局方一般試験法溶出試験法 パドル法

試験液量：900mL

測定方法：液体クロマトグラフィー


各種条件：

試験液	サンプリング時間 (分)	回転数
pH1.2	5,10,15,30,45,60	50rpm
pH4.0	5,10,15,30,45,60,90	
pH6.8	5,10,15,30,45	
水	5,10,15,30	
pH4.0	5,10,15,30	100rpm
試験液温	37.0±0.5℃	
ベッセル数	12 ベッセル	


③試験結果：「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に従って溶出試験を実施した結果、ロスバスタチン OD 錠 5mg「科研」は標準製剤と溶出挙動の類似性が得られなかった²⁾。しかしながら、前述のガイドラインにおいて、「溶出試験による類似性の判定は、生物学的に同等であることを意味するものではない」とされており、健康成人男子を対象とした生物学的同等性試験（「VII. 1. (2) 臨床試験で確認された血中濃度」の項参照）にて、両製剤は生物学的に同等であることが確認されている³⁾。

[ロスバスタチン OD 錠 5mg 「科研」と標準製剤の各種条件下における溶出挙動]


pH1.2, 50rpm




pH4.0, 50rpm




pH6.8, 50rpm



水, 50rpm



pH4.0, 100rpm



(4) ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」

①被験薬剤

試験製剤：ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」

標準製剤：ロスバスタチン OD 錠 5mg 「科研」

②試験条件

試験法：日本薬局方一般試験法溶出試験法 パドル法

試験液量：900mL

測定方法：液体クロマトグラフィー

各種条件：


試験液	サンプリング時間 (分)	回転数
pH1.2	5,10,15,30	50rpm
pH4.0	5,10,15,30	
pH6.8	5,10,15,30	
水	5,10,15,30	
試験液温	37.0±0.5℃	
ベッセル数	12 ベッセル	

③試験結果：ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、ロスバスタチン OD 錠 5mg 「科研」を標準製剤としたとき、全ての試験条件において溶出挙動が同等と判定されたため、生物学的に同等とみなされた²⁾。


IV. 製剤に関する項目

[ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」 と標準製剤の各種条件下における溶出挙動]


pH1.2, 50rpm




pH4.0, 50rpm



pH6.8, 50rpm



水, 50rpm



10. 容器・包装

(1) 注意が必要な容器・包装, 外観が特殊な容器・包装に関する情報

該当資料なし

(2) 包装

[全規格共通]

PTP : 100 錠 (10 錠×10)

(3) 予備容量

該当しない

(4) 容器の材質

[ロスバスタチン錠 2.5mg 「科研」、同錠 5mg 「科研」]

P T P : ポリプロピレン・環状オレフィン、アルミニウム

ピロー : アルミニウム・ポリエチレンラミネートフィルム

個装箱 : 紙

[ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」、同錠 5mg 「科研」]

P T P : ポリプロピレン、アルミニウム

ピロー : アルミニウム・ポリエチレンラミネートフィルム

個装箱 : 紙

11. 別途提供される資材類

なし

12. その他

該当資料なし

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症

2. 効能又は効果に関連する注意

5. 効能又は効果に関連する注意

- 5.1 適用の前に十分な検査を実施し、高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。
- 5.2 家族性高コレステロール血症ホモ接合体については、LDL-アフェレーシス等の非薬物療法の補助として、あるいはそれらの治療法が実施不能な場合に本剤の適用を考慮すること。

3. 用法及び用量

(1) 用法及び用量の解説

通常、成人にはロスバスタチンとして1日1回2.5mgより投与を開始するが、早期にLDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には5mgより投与を開始してもよい。なお、年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは増量後、4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次10mgまで増量できる。10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない、家族性高コレステロール血症患者などの重症患者に限り、さらに増量できるが、1日最大20mgまでとする。

(2) 用法及び用量の設定経緯・根拠

該当資料なし

4. 用法及び用量に関連する注意

7. 用法及び用量に関連する注意

- 7.1 クレアチニンクリアランスが30mL/min/1.73m²未満の患者に投与する場合には、2.5mgより投与を開始し、1日最大投与量は5mgとする。[9.2.2、9.2.3、16.6.3参照]
- 7.2 特に20mg投与時においては腎機能に影響があらわれるおそれがある。20mg投与開始後12週までの間は原則、月に1回、それ以降は定期的（半年に1回等）に腎機能検査を行うなど、観察を十分に行うこと。[9.2.2、9.2.3、16.6.3参照]

5. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当しない

(2) 臨床薬理試験

該当資料なし

(3) 用量反応探索試験

〈高コレステロール血症〉

海外第Ⅲ相用量反応試験

高コレステロール血症患者を対象として二重盲検法により実施された試験において、ロスバスタチンカルシウム（5～80mg）又はアトルバスタチン（10～80mg）を1日1回6週間投与した結果、ロスバスタチンカルシウムは、LDL-コレステロール、総コレステロール、トリグリセリドには低下効果を、HDL-コレステロールには増加効果を示した。また、アポ蛋白B、非HDL-コレステロールを低下させ、アポ蛋白A-Iを増加させた。更に、LDL-コレステロール/HDL-コレステロール比、総コレステロール/HDL-コレステロール比、非HDL-コレステロール/HDL-コレステロール比、アポ蛋白B/アポ蛋白A-I比を低下させた。

ロスバスタチンカルシウムの薬効は、投与後1週間以内にあらわれ、通常2週間までに最大効

果の 90%となった。最大効果は通常 4 週間までにあらわれ、その後持続した。副作用発現頻度は、ロスバスタチンカルシウム 5mg 投与群で 10.5% (4/38 例)、10mg 投与群では 15.6% (7/45 例)、及び 20mg 投与群で 17.9% (7/39 例) であった。いずれの投与群でも、3 例以上発現した副作用はなかった^{4,5)}。

(4) 検証的試験

1) 有効性検証試験

〈高コレステロール血症〉

①国内第Ⅱ相試験

二重盲検法により実施された試験において、ロスバスタチンカルシウム 2.5~20mg を 1 日 1 回 6 週間投与した際の血清脂質値の平均変化率は表 1 のとおりであった。副作用発現頻度は、ロスバスタチンカルシウム 2.5mg 投与群で 38.9% (7/18 例)、5mg 投与群で 20.0% (3/15 例)、10mg 投与群で 13.3% (2/15 例)、及び 20mg 投与群で 47.4% (9/19 例) であった。計 67 例において 3 例以上認められた副作用は、腹痛、CK 上昇及び γ -GTP 上昇 (各 3 例) であった⁶⁾。

表 1 血清脂質値の平均変化率 (高コレステロール血症患者対象試験)

投与量	2.5mg (n=17)	5mg (n=12)	10mg (n=14)	20mg (n=18)
LDL-コレステロール (%)	-44.99	-52.49	-49.60	-58.32
総コレステロール (%)	-31.59	-36.40	-34.60	-39.58
トリグリセリド (%)	-17.35	-23.58	-19.59	-17.01
HDL-コレステロール (%)	7.64	9.09	14.04	11.25
アポ蛋白 B (%)	-38.56	-45.93	-43.97	-50.38
アポ蛋白 A-I (%)	5.42	6.25	10.61	9.72
アポ蛋白 A-II (%)	0.38	4.27	7.78	7.73

②海外第Ⅲ相試験

二重盲検法により実施された 3 試験の集積データをまとめた。ロスバスタチンカルシウム 5mg 又は 10mg を 1 日 1 回 12 週間投与した際の血清脂質の平均変化率は表 2 のとおりであり、高コレステロール血症患者の脂質レベルを総合的に改善することが認められた⁷⁾。

表 2 血清脂質値の平均変化率 (外国人高コレステロール血症患者対象試験)

投与量	5mg (n=390)	10mg (n=389)
LDL-コレステロール (%)	-41.9	-46.7
総コレステロール (%)	-29.6	-33.0
トリグリセリド (%)	-16.4	-19.2
HDL-コレステロール (%)	8.2	8.9
非 HDL-コレステロール (%)	-38.2	-42.6
アポ蛋白 B (%)	-32.7	-36.5
アポ蛋白 A-I (%)	6.0	7.3

③海外第Ⅲ相長期投与試験

高コレステロール血症患者を対象として二重盲検法により実施された試験において、ロスバスタチンカルシウム 5mg 又は 10mg から投与を開始し、LDL-コレステロール値が NCEPⅡガイドラインの目標値に達するまで増量した。52 週時において初回投与量の 5mg 又は 10mg の継続投与を受けていた症例の割合は、それぞれ 76% (92/121 例) 及び 82% (88/107 例) であった。副作用の発現率はロスバスタチンカルシウム 5mg 群で 29.4% (40/136 例)、ロスバスタチンカルシウム 10mg 群で 26.5% (35/132 例) であった。いずれかの投与群で 3 例以上発現した副作用は下痢、消化不良、鼓腸、筋痛、不眠症、発疹、腹痛及び無力症であった^{8,9)}。

〈家族性高コレステロール血症〉

④国内第Ⅱ相長期投与試験

家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体患者にロスバスタチンカルシウム 10mg から投与を開始し、6 週間隔で強制増量した。そのときの血清脂質値の平均変化率は表 3 のとおりであった¹⁰⁾。

3 例以上に認められた副作用は CK 上昇 (3/37 例、8.1%) であった¹¹⁾。

表 3 血清脂質値の平均変化率 (家族性高コレステロール血症患者対象試験)

投与量	10mg (n=37)	20mg (n=37)
LDL-コレステロール (%)	-49.2	-53.9
総コレステロール (%)	-39.4	-43.3
トリグリセリド (%)	-18.2	-23.6
HDL-コレステロール (%)	9.6	13.8

2) 安全性試験

該当資料なし

(5) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6) 治療的使用

1) 使用成績調査 (一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査)、製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験の内容
該当しない

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要
該当しない

(7) その他

該当資料なし

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、フルバスタチンナトリウム、アトルバスタチンナトリウム、ピタバスタチンカルシウム 等

注意：関連のある化合物の効能・効果等は、最新の添付文書を参照すること

2. 薬理作用

(1) 作用部位・作用機序

ロスバスタチンカルシウムは、肝臓内に能動的に取り込まれ、肝臓でのコレステロール生合成系の律速酵素である HMG-CoA 還元酵素を選択的かつ競合的に阻害し、コレステロール生合成を強力に抑制する。その結果、肝臓内のコレステロール含量が低下し、これを補うため LDL 受容体の発現が誘導される。この LDL 受容体を介して、コレステロール含有率の高いリポ蛋白である LDL の肝臓への取り込みが増加し、血中コレステロールが低下する。ロスバスタチンカルシウムは、肝臓では主として能動輸送系を介して取り込まれ、脂質親和性が比較的低いため、能動輸送系を持たない他の臓器には取り込まれにくく、肝特異的な HMG-CoA 還元酵素阻害剤であると考えられる^{12,13)}。

1) HMG-CoA 還元酵素阻害作用

ロスバスタチンカルシウムは、ラット及びヒト肝ミクロソーム由来の HMG-CoA 還元酵素及びヒト HMG-CoA 還元酵素の触媒ドメインに対して阻害作用を示した (*in vitro*)¹⁴⁾。

2) 肝コレステロール合成阻害作用

ロスバスタチンカルシウムは、ラット肝細胞のコレステロール合成を用量依存的に阻害した。また、その阻害作用は、他の HMG-CoA 還元酵素阻害剤に比べて長期間持続した¹⁴⁾。

3) LDL 受容体誘導作用

ロスバスタチンカルシウムは、ヒト肝癌由来 HepG2 細胞の LDL 受容体 mRNA の発現を濃度依存的に誘導し、また、LDL 結合活性を増加させた (*in vitro*)¹⁵⁾。

(2) 薬効を裏付ける試験成績

1) 血中コレステロール低下作用

ロスバスタチンカルシウムは、イヌ¹⁶⁾、カニクイザル¹⁷⁾、WHHL ウサギ（ヒト家族性高コレステロール血症のモデル動物）¹⁸⁾において血清総コレステロールを、また、アポ蛋白 E*3Leiden トランスジェニックマウス（高 VLDL 血症モデル動物）¹⁹⁾及びヒトアポ蛋白 B/CETP（コレステロールエステル転送蛋白）トランスジェニックマウス（ヒトのコレステロール代謝に類似した脂質代謝環境を有するモデル動物）²⁰⁾においては血漿中コレステロールを有意に低下させた。イヌにおいては、HMG-CoA 還元酵素の反応産物であるメバロン酸の血中濃度を用量依存的に低下させた¹⁶⁾。

2) 動脈硬化進展抑制作用

ロスバスタチンカルシウムは、WHHL ウサギにおいて、大動脈の脂質沈着面積、コレステロール含量の低下をもたらし、動脈硬化病変の進展を抑制した¹⁸⁾。

3) トリグリセリド低下作用

ロスバスタチンカルシウムは、アポ蛋白 E*3Leiden トランスジェニックマウス及びヒトアポ蛋白 B/CETP トランスジェニックマウスの血漿中トリグリセリドを低下させた^{19,20)}。

(3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 臨床試験で確認された血中濃度

1) 単回投与

健康成人男性 6 例にロスバスタチンカルシウムを 5mg の用量で空腹時に単回経口投与したところ、血漿中ロスバスタチン濃度は投与後 5 時間に C_{max} を示し、消失半減期 ($t_{1/2}$) は 20.2 ± 7.8 時間であった。また、 C_{max} 及び AUC_{0-24h} はそれぞれ $3.56 \pm 1.35 \text{ ng/mL}$ 及び $31.3 \pm 13.6 \text{ ng}\cdot\text{hr/mL}$ であった (平均値 \pm 標準偏差)²¹⁾。なお、ロスバスタチンの体内動態は線形であると考えられている (外国人データ)²²⁾。

2) 反復投与

健康成人男性 6 例にロスバスタチンカルシウム 10 及び 20mg を 1 日 1 回 7 日間、空腹時に反復経口投与したところ、投与後 24 時間の血漿中ロスバスタチン濃度は徐々に上昇し、反復投与 3 回目にはほぼ定常状態に到達した²³⁾。定常状態における AUC_{0-24h} は単回投与時の 1.2 倍であり、その値は単回投与での結果からの予測値と同程度であった。したがって、反復投与による予想以上の蓄積性はないと考えられた。なお、日本人における C_{max} 及び AUC は白人の約 2 倍であった²⁴⁾。

表 1 健康成人男性におけるロスバスタチンの薬物動態パラメータ (n=6)

用量 (mg)	C_{max} ^{a)} (ng/mL)	T_{max} ^{b)} (hr)	AUC_{0-24h} ^{a)} (ng·hr/mL)	$AUC_{0-\infty}$ ^{a)} (ng·hr/mL)	$t_{1/2}$ ^{c)} (hr)	
10	単回	7.87 (54.4)	5 (4-5)	74.2 (56.0)	126 (39.3) ^{d)}	$15.1 \pm 5.36^d)$
	反復	9.38 (71.5)	5 (5-5)	90.5 (67.0)	167 (30.0) ^{e)}	
20	単回	20.5 (54.6)	4 (3-5)	171 (53.0)	209 (50.1)	19.1 ± 5.81
	反復	22.1 (68.0)	5 (5-5)	206 (63.9)	248 (62.2)	

a) 幾何平均値 (変動係数)、b) 中央値 (範囲)、c) 平均値 \pm 標準偏差、d) n=3、e) n=4

高コレステロール血症患者にロスバスタチンカルシウム 2.5~20mg を 1 日 1 回 6 週間反復経口投与し、定常状態の血漿中ロスバスタチン濃度を測定した²⁵⁾。高コレステロール血症患者の血漿中ロスバスタチン濃度は用量にほぼ比例して増加し、健康成人男性での値 (投与後 10 時間の幾何平均値、10mg : 4.06 ng/mL 、20mg : 9.82 ng/mL) とほぼ同程度であった。なお、本試験で日本人と外国人の結果を比較したところ、日本人における定常状態の血漿中ロスバスタチン濃度は外国人の約 2 倍であった²⁶⁾。

表 2 高コレステロール血症患者における定常状態の血漿中ロスバスタチン濃度

投与量	血漿中ロスバスタチン濃度 (ng/mL)
2.5mg (n=16)	1.26 (72.7)
5mg (n=12)	2.62 (41.5)
10mg (n=13)	4.17 (75.5)
20mg (n=17)	11.7 (50.0)

採血時間：投与後 7~16 時間

幾何平均値 (変動係数)

3) 投与時間の影響


外国人健康成人 21 例にロスバスタチンカルシウム 10mg をクロスオーバー法で 1 日 1 回 14 日間、午前 7 時あるいは午後 6 時に経口投与したところ、血漿中ロスバスタチン濃度推移は両投与時間で同様であり、ロスバスタチンカルシウムの体内動態は投与時間の影響を受けないと考えられた²⁷⁾。

4) 生物学的同等性試験

①ロスバスタチン錠 5mg「科研」

(「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」(平成 24 年 2 月 29 日改正 薬食審査発 0229 第 10 号 別紙 1) に準拠し実施)

健康成人男子にロスバスタチン錠 5mg「科研」とクレストール錠 5mg のそれぞれ 1 錠(ロスバスタチンとして 5mg)を、絶食時単回経口投与して血漿中ロスバスタチン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、 C_{max})について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された(クロスオーバー法)³⁾。



薬物動態パラメータ (平均±標準偏差、n=23)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC (ng・hr/mL)	C_{max} (ng/mL)	T_{max} (hr)	$T_{1/2}$ (hr)
ロスバスタチン錠 5mg「科研」	62.24±24.72	6.35±3.13	4.7±0.7	13.5±2.5
クレストール錠 5mg	63.43±25.27	6.08±2.49	4.6±1.0	14.1±2.6

血漿中濃度並びに AUC、 C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

②ロスバスタチン錠 2.5mg「科研」


ロスバスタチン錠 2.5mg「科研」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、ロスバスタチン錠 5mg「科研」を標準製剤としたとき、全ての試験条件において溶出挙動が同等と判定されたため、生物学的に同等とみなされた(「IV. 9. 溶出性」の項参照)。

③ロスバスタチン OD 錠 5mg「科研」

(「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」(平成 24 年 2 月 29 日改正 薬食審査発 0229 第 10 号 別紙 1) に準拠し実施)

健康成人男子にロスバスタチン OD 錠 5mg「科研」とクレストール錠 5mg のそれぞれ 1 錠(ロスバスタチンとして 5mg)を、絶食時単回経口投与して血漿中ロスバスタチン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、 C_{max})について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された(クロスオーバー法)³⁾。

水あり投与




薬物動態パラメータ (平均±標準偏差、n=20)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)
ロスバスタチン錠 5mg「科研」	72.76±26.81	6.39±2.34	4.6±1.0	16.2±10.2
Crestor錠 5mg	69.42±25.73	6.26±2.51	4.1±1.1	14.2±3.8

血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

水なし投与 (Crestor錠 5mg は水で服用)



薬物動態パラメータ (平均±標準偏差、n=20)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)
ロスバスタチン OD 錠 5mg「科研」	81.56±17.09	7.28±1.78	4.4±1.1	14.4±2.9
Crestor錠 5mg	75.31±23.25	6.87±2.23	4.4±1.2	18.2±6.5

血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

④ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」

ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、ロスバスタチン OD 錠 5mg 「科研」を標準製剤としたとき、全ての試験条件において溶出挙動が同等と判定されたため、生物学的に同等とみなされた（「IV. 9. 溶出性」の項参照）。

(3) 中毒域

該当資料なし

(4) 食事・併用薬の影響

1) 食事の影響（外国人データ）

外国人健康成人 20 例にロスバスタチンカルシウム 10mg をクロスオーバー法で 1 日 1 回 14 日間、空腹時（食後 3 時間）あるいは食後に経口投与した²⁸⁾。食後投与したときのロスバスタチンカルシウムの吸収は空腹時に比べて緩やかであり、 C_{max} は食事によって 20% 低下した。しかし、食後投与時の AUC_{0-24h} は空腹時投与の 94% であり、ロスバスタチンカルシウムの吸収量への食事の影響はないと考えられた。

2) 併用薬の影響

①制酸剤

制酸剤を同時併用投与した場合、ロスバスタチンの C_{max} 及び AUC_{0-24h} はそれぞれ 50% 及び 46% まで低下したが、ロスバスタチン投与後 2 時間に制酸剤を投与した場合には、ロスバスタチンの C_{max} 及び AUC_{0-24h} はそれぞれ非併用時の 84% 及び 78% であった（外国人データ）^{29,30)}。

②シクロスポリン

シクロスポリンを投与されている心臓移植患者にロスバスタチンを併用投与したとき、ロスバスタチンの C_{max} 及び AUC_{0-24h} は、健康成人に単独で反復投与したときに比べてそれぞれ 10.6 倍及び 7.1 倍上昇した（外国人データ）³⁰⁾。ロスバスタチンは OATP1B1 を介して肝臓に取り込まれ、シクロスポリンはその取り込みを阻害することによって、ロスバスタチンの血漿中濃度を増加させると考えられている。

③ゲムフィブロジル

ゲムフィブロジル（本邦未承認）と併用投与したとき、ロスバスタチンの C_{max} 及び AUC_{0-t} はそれぞれ 2.21 倍及び 1.88 倍に増加した（外国人データ）³¹⁾。ロスバスタチンは OATP1B1 を介して肝臓に取り込まれ、ゲムフィブロジルはその取り込みを阻害することによって、ロスバスタチンの血漿中濃度を増加させると考えられている。

④その他の薬剤

ロスバスタチンの体内動態に及ぼす P450 阻害剤の影響を検討するために、フルコナゾール³²⁾（CYP2C9 及び CYP2C19 の阻害剤）、ケトコナゾール³³⁾、イトラコナゾール³⁴⁾ 及び エリスロマイシン³⁵⁾（以上 CYP3A4 及び P 糖蛋白の阻害剤）との併用試験を実施したが、明らかな相互作用は認められなかった（外国人データ）。

ワルファリン³⁶⁾（CYP2C9 及び CYP3A4 の基質）あるいはジゴキシン³⁷⁾の体内動態に及ぼす影響を検討したが、薬物動態学的相互作用は認められなかった（外国人データ）。CYP3A4 誘導作用の有無を検討するために、経口避妊薬との併用試験を実施したが、エチニルエストラジオールの血漿中濃度に減少はみられず、ロスバスタチンは CYP3A4 に対する誘導作用を示さないと考えられた（外国人データ）³⁸⁾。

⑤ *in vitro* 試験

ヒト遊離肝細胞を用いる *in vitro* 試験において *N*-脱メチル体が生成したが、その代謝速度は非常に緩徐であった。また、*N*-脱メチル化に関与する主な P450 分子種は CYP2C9 及び CYP2C19 であったが、CYP2D6 や CYP3A4 が関与する可能性も示唆された^{39,40)}。

ロスバスタチン (50 μ g/mL) による P450 (CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1 及び CYP3A4) 活性の阻害率は 10% 以下であった³⁹⁾。

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) 消失速度定数

[ロスバスタチン錠 5mg 「科研」]

投与量	5.2mg (ロスバスタチンとして 5mg)
Kel (hr ⁻¹)	0.0533±0.0099

(平均±標準偏差)

[ロスバスタチン OD 錠 5mg 「科研」]

投与量	5.2mg (ロスバスタチンとして 5mg)	
	水あり (n=20)	水なし (n=20)
Kel (hr ⁻¹)	0.0511±0.0169	0.0499±0.0089

(平均±標準偏差)

(4) クリアランス

健康成人男性 10 例にロスバスタチンカルシウムを静脈内投与して得られたロスバスタチンの全身クリアランス及び腎クリアランスはそれぞれ 31.9 及び 11.6L/hr であり、ロスバスタチンは主に肝臓による消失を受けると考えられた⁴⁾。

(5) 分布容積

該当資料なし

(6) その他

該当資料なし

3. 母集団 (ポピュレーション) 解析

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) パラメータ変動要因

該当資料なし

4. 吸 収

(1) バイオアベイラビリティ

健康成人男性 10 例にロスバスタチンカルシウムを静脈内投与したところ生物学的利用率は 29.0% (90%信頼区間: 24.1~34.9) であった⁴⁾。また、静脈内投与して得られたロスバスタチンの全身クリアランス及び腎クリアランスはそれぞれ 31.9 及び 11.6L/hr であり、ロスバスタチンは主に肝臓による消失を受けると考えられた。

5. 分 布

(1) 血液 - 脳関門通過性

該当資料なし

(2) 血液 - 胎盤関門通過性

該当資料なし

<参考>

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないが、ラットに他の HMG-CoA 還元酵素阻害剤を大量投与した場合に胎児の骨格奇形が報告されている。更にヒトでは、他の HMG-CoA 還元酵素阻害剤で、妊娠 3 ヶ月までの間に服用したとき、胎児に先天性奇形があらわれたとの報告がある（「VIII. 6. (5) 妊婦」の項参照）。

(3) 乳汁への移行性

該当資料なし

<参考>

ラットで乳汁中への移行が報告されている（「VIII. 6. (6) 授乳婦」の項参照）。

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

該当資料なし

(6) 血漿蛋白結合率

ヒト血漿中におけるロスバスタチンの蛋白結合率は 89.0%（日本人）～88.0%（外国人）であり、主結合蛋白はアルブミンであった⁴²⁾。

6. 代 謝

(1) 代謝部位及び代謝経路

外国人健康成人男性 6 例に ¹⁴C-ロスバスタチンカルシウム 20mg を単回経口投与したところ、尿及び糞中に存在する放射能の主成分は未変化体であり、尿糞中の主な代謝物は、*N*-脱メチル体及び *5S*-ラクトン体であった⁴³⁾。

(2) 代謝に関与する酵素（CYP 等）の分子種、寄与率

該当資料なし

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び活性比、存在比率

ヒト血漿中には *N*-脱メチル体及び *5S*-ラクトン体が検出されたが、HMG-CoA 還元酵素阻害活性体濃度はロスバスタチン濃度と同様の推移を示し、血漿中における HMG-CoA 還元酵素阻害活性に対する代謝物の寄与はわずかであると考えられた（外国人データ）⁴⁴⁾。

7. 排 泄

(1) 排泄部位及び経路

主に胆汁排泄により糞中から排泄される。

(2) 排泄率

外国人健康成人男性 6 例に ¹⁴C-ロスバスタチンカルシウム 20mg を単回経口投与したところ、放射能は主に糞中に排泄され（90.2%）、尿中放射能排泄率は 10.4%であった。また、尿及び糞中への未変化体排泄率は、それぞれ投与量の 4.9%及び 76.8%であった⁴³⁾。

(3) 排泄速度

該当資料なし

8. トランスポーターに関する情報

本剤は、OATP1B1 及び BCRP の基質である。

9. 透析等による除去率

該当資料なし

10. 特定の背景を有する患者

(1) 性差及び加齢の影響

外国人の男性若年者、男性高齢者、女性若年者及び女性高齢者各 8 例にロスバスタチンカルシウム 40mg (承認外用量) を単回経口投与したところ、男性の C_{max} 及び AUC_{0-t} はそれぞれ女性の 82% 及び 91% であった⁴⁵⁾。また、若年者の C_{max} 及び AUC_{0-t} はそれぞれ高齢者の 112% 及び 106% であり、臨床上問題となる性差や加齢の影響はないと考えられた。

(2) 肝障害の影響

Child-PughA (スコア : 5~6) あるいは Child-PughB (スコア : 7~9) の肝障害を有する外国人患者各 6 例にロスバスタチンカルシウム 10mg を 1 日 1 回 14 日間反復経口投与し、血漿中ロスバスタチン濃度を測定した⁴⁶⁾。肝障害患者の C_{max} 及び AUC_{0-24h} は健康成人群のそれぞれ 1.5~2.1 倍及び 1.05~1.2 倍であり、特に、Child-Pugh スコアが 8~9 の患者 2 例における血漿中濃度は、他に比べて高かった。

(3) 腎障害の影響

重症度の異なる腎障害を有する外国人患者 (4~8 例) にロスバスタチンカルシウム 20mg を 1 日 1 回 14 日間反復経口投与し、血漿中ロスバスタチン濃度を測定した⁴⁷⁾。軽度から中等度の腎障害のある患者では、ロスバスタチンの血漿中濃度に対する影響はほとんど認められなかった。しかし、重度 (クレアチニンクリアランス $<30\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2$) の腎障害のある患者では、健康成人に比べて血漿中濃度が約 3 倍に上昇した。

11. その他

該当資料なし

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由

該当しない

2. 禁忌内容とその理由

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 肝機能が低下していると考えられる以下のような患者
急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝癌、黄疸 [9.3.1、9.3.2、16.6.2 参照]
- 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性及び授乳婦 [9.5、9.6 参照]
- 2.4 シクロスポリンを投与中の患者 [10.1、16.7.2 参照]

3. 効能又は効果に関連する注意とその理由

「V. 2. 効能又は効果に関連する注意」の項を参照すること。

4. 用法及び用量に関連する注意とその理由

「V. 4. 用法及び用量に関連する注意」の項を参照すること。

5. 重要な基本的注意とその理由

8. 重要な基本的注意

- 8.1 あらかじめ高コレステロール血症治療の基本である食事療法を行い、更に運動療法や高血圧、喫煙等の虚血性心疾患のリスクファクターの軽減等も十分考慮すること。
- 8.2 投与中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が認められない場合には投与を中止すること。
- 8.3 投与開始又は増量後 12 週までの間は原則、月に 1 回、それ以降は定期的（半年に 1 回等）に肝機能検査を行うこと。[11.1.5 参照]
- 8.4 血小板減少があらわれることがあるので、血液検査等の観察を十分に行うこと。[11.1.6 参照]

6. 特定の背景を有する患者に関する注意

(1) 合併症・既往歴等のある患者

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある以下の患者

- ・アルコール中毒患者
- ・甲状腺機能低下症の患者
- ・遺伝性の筋疾患（筋ジストロフィー等）又はその家族歴のある患者
- ・薬剤性の筋障害の既往歴のある患者

9.1.2 重症筋無力症又はその既往歴のある患者

重症筋無力症（眼筋型、全身型）が悪化又は再発することがある。 [11.1.4 参照]

(2) 腎機能障害患者

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 腎機能検査値異常のある患者

本剤とフィブラート系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にのみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。[10.2 参照]

9.2.2 腎障害又はその既往歴のある患者

横紋筋融解症の報告例の多くが腎機能障害を有する患者であり、また、横紋筋融解症に伴って急激な腎機能悪化があらわれることがある。[7.1、7.2、16.6.3 参照]

9.2.3 重度の腎障害のある患者

本剤の血中濃度が高くなるおそれがある。[7.1、7.2、16.6.3 参照]

(3) 肝機能障害患者

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 肝機能が低下していると考えられる以下のような患者

急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝癌、黄疸

投与しないこと。これらの患者では、本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。また、本剤は主に肝臓に分布して作用するので、肝障害を悪化させるおそれがある。[2.2、16.6.2 参照]

9.3.2 肝障害又はその既往歴のある患者

本剤は主に肝臓に分布して作用するので、肝障害又はその既往歴のある患者では、肝障害を悪化させるおそれがある。特に、Child-Pugh スコアが 8~9 の患者では、血漿中濃度が他に比べて高かったとの報告がある。[2.2、16.6.2 参照]

(4) 生殖能を有する者

設定されていない

(5) 妊婦

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。ラットに他の HMG-CoA 還元酵素阻害剤を大量投与した場合に胎児の骨格奇形が報告されている。更にヒトでは、他の HMG-CoA 還元酵素阻害剤で、妊娠 3 ヶ月までの間に服用したとき、胎児に先天性奇形があらわれたとの報告がある。[2.3 参照]

(6) 授乳婦

9.6 授乳婦

投与しないこと。ラットで乳汁中への移行が報告されている。[2.3 参照]

(7) 小児等

9.7 小児等

小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

(8) 高齢者

設定されていない

7. 相互作用

(1) 併用禁忌とその理由

10. 相互作用

本剤は、OATP1B1 及び BCRP の基質である。

10.1 併用禁忌 (併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
シクロスポリン (サンディミュン、ネオーラル等) [2.4、16.7.2 参照]	シクロスポリンを投与されている心臓移植患者に併用したとき、シクロスポリンの血中濃度に影響はなかったが、本剤の AUC _{0-24h} が健康成人に単独で反復投与したときに比べて約 7 倍上昇したとの報告がある。	シクロスポリンが OATP1B1 及び BCRP 等の機能を阻害する可能性がある。

(2) 併用注意とその理由

10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
フィブラート系薬剤 ベザフィブラート等 [9.2.1 参照]	フェノフィブラートとの併用においては、いずれの薬剤の血中濃度にも影響はみられていない。しかし一般に、HMG-CoA 還元酵素阻害剤との併用で、筋肉痛、脱力感、CK 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	両剤共に横紋筋融解症の報告がある。 危険因子：腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者
ニコチン酸 アゾール系抗真菌薬 イトラコナゾール等 マクロライド系抗生物質 エリスロマイシン等	一般に、HMG-CoA 還元酵素阻害剤との併用で、筋肉痛、脱力感、CK 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	危険因子：腎機能障害のある患者
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン	抗凝血作用が増強することがある。本剤を併用する場合は、本剤の投与開始時及び用量変更時にも頻回にプロトロンビン時間国際標準比 (INR) 値等を確認し、必要に応じてワルファリンの用量を調節する等、注意深く投与すること。	機序は不明
制酸剤 水酸化マグネシウム・水酸化アルミニウム [16.7.1 参照]	本剤の血中濃度が約 50% に低下することが報告されている。ロスバスタチン投与後 2 時間経過後に制酸剤を投与した場合には、本剤の血中濃度は非併用時の約 80% であった。	
ロピナビル・リトナビル アタザナビル/リトナビル ダルナビル/リトナビル グレカプレビル・ピブレンタスビル	本剤とロピナビル・リトナビルを併用したとき本剤の AUC が約 2 倍、C _{max} が約 5 倍、アタザナビル及びリトナビル両剤と本剤を併用したとき本剤の AUC が約 3 倍、C _{max} が 7 倍、ダルナビル及びリトナビル両剤と本剤を併用したとき本剤の AUC が約 1.5 倍、C _{max} が約 2.4 倍上昇したとの報告がある。また本剤とグレカプレビル・ピブレンタスビル ^(注) を併用したとき、本剤の AUC が約 2.2 倍、C _{max} が約 5.6 倍上昇したとの報告がある。	左記薬剤が OATP1B1 及び BCRP の機能を阻害する可能性がある。

ダクラタスビル アスナプレビル ダクラタスビル・アスナプレビル ベクラブビル	本剤とダクラタスビル、アスナプレビル、またはダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル ^{注)} を併用したとき、本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。	ダクラタスビル、ベクラブビルが OATP1B1、1B3 及び BCRP の機能を阻害する可能性がある。また、アスナプレビルが OATP1B1、1B3 の機能を阻害する可能性がある。
グラゾプレビル/エルバスビル	本剤とグラゾプレビル ^{注)} 及びエルバスビルを併用したとき、本剤の AUC が約 2.3 倍、C _{max} が約 5.5 倍上昇したとの報告がある。	左記薬剤が BCRP の機能を阻害する可能性がある。
ソホスブビル・ベルパタスビル	本剤とベルパタスビルを併用したとき、本剤の AUC が約 2.7 倍、C _{max} が約 2.6 倍上昇したとの報告がある。	ベルパタスビルが OATP1B1、1B3 及び BCRP の機能を阻害する可能性がある。
ダロルタミド	本剤とダロルタミドを併用したとき、本剤の AUC が 5.2 倍 ⁴⁸⁾ 、C _{max} が 5.0 倍上昇したとの報告がある。	ダロルタミドが OATP1B1、1B3 及び BCRP の機能を阻害する可能性がある。
レゴラフェニブ	本剤とレゴラフェニブを併用したとき、本剤の AUC が 3.8 倍、C _{max} が 4.6 倍上昇したとの報告がある。	レゴラフェニブが BCRP の機能を阻害する可能性がある。
カプマチニブ塩酸塩水和物	本剤とカプマチニブ塩酸塩水和物を併用したとき、本剤の AUC が約 2.1 倍、C _{max} が約 3.0 倍上昇したとの報告がある。	カプマチニブ塩酸塩が BCRP の機能を阻害することにより、ロスバスタチンの血中濃度が増加する可能性がある。
バダデュスタット	本剤とバダデュスタットを併用したとき、本剤の AUC が約 2.5 倍、C _{max} が約 2.7 倍上昇したとの報告がある。	バダデュスタットが BCRP の機能を阻害することにより、ロスバスタチンの血中濃度が増加する可能性がある。
フェブキシソスタット	本剤とフェブキシソスタットを併用したとき、本剤の AUC が約 1.9 倍、C _{max} が約 2.1 倍上昇したとの報告がある。	フェブキシソスタットが BCRP の機能を阻害することにより、ロスバスタチンの血中濃度が増加する可能性がある。
エルトロンボパグ	本剤とエルトロンボパグを併用したとき、本剤の AUC が約 1.6 倍上昇したとの報告がある。	エルトロンボパグが OATP1B1 及び BCRP の機能を阻害する可能性がある。
ホスタマチニブナトリウム水和物	本剤とホスタマチニブナトリウム水和物を併用したとき、本剤の AUC が 1.96 倍、C _{max} が 1.88 倍上昇したとの報告がある。	ホスタマチニブナトリウム水和物が BCRP の機能を阻害する可能性がある。
ロキサデュスタット	本剤とロキサデュスタットを併用したとき、本剤の AUC が 2.93 倍、C _{max} が 4.47 倍上昇したとの報告がある。	ロキサデュスタットが OATP1B1 及び BCRP の機能を阻害する可能性がある。
タファミジス	本剤とタファミジスを併用したとき、本剤の AUC が 1.97 倍、C _{max} が 1.86 倍上昇したとの報告がある。	タファミジスが BCRP の機能を阻害する可能性がある。

注) 承認用量外の用量における試験結果に基づく。

8. 副作用

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(1) 重大な副作用と初期症状

11.1 重大な副作用

11.1.1 横紋筋融解症 (0.1%未満)

筋肉痛、脱力感、CK 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれ、急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止すること。

11.1.2 ミオパチー (頻度不明)

広範な筋肉痛、高度な脱力感や著明な CK の上昇があらわれた場合には投与を中止すること。

11.1.3 免疫介在性壊死性ミオパチー (頻度不明)

近位筋脱力、CK 高値、炎症を伴わない筋線維の壊死、抗 HMG-CoA 還元酵素 (HMGCR) 抗体陽性等を特徴とする免疫介在性壊死性ミオパチーがあらわれ、投与中止後も持続する例が報告されているので、患者の状態を十分に観察すること。なお、免疫抑制剤投与により改善がみられたとの報告例がある。

11.1.4 重症筋無力症 (頻度不明)

重症筋無力症 (眼筋型、全身型) が発症又は悪化することがある。[9.1.2 参照]

11.1.5 肝炎 (0.1%未満)、肝機能障害 (1%未満)、黄疸 (頻度不明)

肝炎、AST、ALT の上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。[8.3 参照]

11.1.6 血小板減少 (0.1%未満) [8.4 参照]

11.1.7 過敏症状 (0.1%未満)

血管浮腫を含む過敏症状があらわれることがある。

11.1.8 間質性肺炎 (0.1%未満)

長期投与であっても、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部 X 線異常等が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.9 末梢神経障害 (0.1%未満)

四肢の感覚鈍麻、しびれ感等の感覚障害、疼痛、あるいは筋力低下等の末梢神経障害があらわれることがある。

11.1.10 多形紅斑 (頻度不明)

(2) その他の副作用

11.2 その他の副作用

	2～5%未満	0.1～2%未満	0.1%未満	頻度不明
皮膚		そう痒症、発疹、じん麻疹		苔癬様皮疹
消化器		腹痛、便秘、嘔気、下痢	腭炎、口内炎	
筋・骨格系	CK 上昇	無力症、筋肉痛、関節痛	筋痙攣	
精神神経系		頭痛、浮動性めまい	健忘、睡眠障害 (不眠、悪夢等)、抑うつ	
内分泌				女性化乳房
代謝異常			HbA1c 上昇、血糖値上昇	
肝臓	肝機能異常 (AST 上昇、ALT 上昇)			
腎臓		蛋白尿 ^{注)} 、腎機能異常 (BUN 上昇、血清クレアチニン上昇)		

注) 通常一過性であるが、原因不明の蛋白尿が持続する場合には減量するなど適切な処置を行うこと。発現頻度は使用成績調査から算出した。

9. 臨床検査結果に及ぼす影響

設定されていない

10. 過量投与

設定されていない

11. 適用上の注意

14. 適用上の注意

[ロスバスタチン錠 2.5mg「科研」、同錠 5mg「科研」]

14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

[ロスバスタチン OD 錠 2.5mg「科研」、同 OD 錠 5mg「科研」]

14.1. 薬剤交付時の注意

14.1.1 PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

14.1.2 本剤は舌の上に乗せて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能である。また、水で服用することもできる。

12. その他の注意

(1) 臨床使用に基づく情報

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

海外において、本剤を含む HMG-CoA 還元酵素阻害剤投与中の患者では、糖尿病発症のリスクが高かったとの報告がある。

(2) 非臨床試験に基づく情報

設定されていない

IX. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験

「VI. 薬効薬理に関する項目」参照

(2) 安全性薬理試験

該当資料なし

(3) その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 遺伝毒性試験

該当資料なし

(4) がん原性試験

該当資料なし

(5) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

(6) 局所刺激性試験

該当資料なし

(7) その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製 剤：処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）
有効成分：該当しない

2. 有効期間

[ロスバスタチン錠 2.5mg 「科研」、同錠 5mg 「科研」]

有効期間：3年

[ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」、同 OD 錠 5mg 「科研」]

有効期間：2年

3. 包装状態での貯法

[ロスバスタチン錠 2.5mg 「科研」、同錠 5mg 「科研」]

室温保存

[ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」、同 OD 錠 5mg 「科研」]

遮光、室温保存

4. 取扱い上の注意

20. 取扱い上の注意

[ロスバスタチン錠 2.5mg 「科研」、同錠 5mg 「科研」]

アルミピロー包装開封後は湿気を避けて保存すること。

[ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」、同 OD 錠 5mg 「科研」]

アルミピロー包装開封後は湿気を避けて遮光して保存すること。

5. 患者向け資材

患者向医薬品ガイド：あり

くすりのしおり：あり

6. 同一成分・同効薬

同一成分薬：クレストール錠、クレストール OD 錠

同 効 薬：プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、フルバスタチンナトリウム、
アトルバスタチンカルシウム、ピタバスタチンカルシウム

7. 国際誕生年月日

2002年11月6日（オランダ）

8. 製造販売承認年月日及び承認番号，薬価基準収載年月日，販売開始年月日

販売名	製造販売承認年月日	承認番号	薬価基準収載年月日	販売開始年月日
ロスバスタチン錠 2.5mg 「科研」	2017年8月15日	22900AMX00940000	2017年12月8日	2017年12月8日
ロスバスタチン錠 5mg 「科研」		22900AMX00941000		
ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」		22900AMX00832000		
ロスバスタチン OD 錠 5mg 「科研」		22900AMX00833000		

9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

効能追加及び用法用量の追加（下線部） [2023年7月19日承認]

○効能又は効果

高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症

○用法及び用量

通常、成人にはロスバスタチンとして1日1回2.5mgより投与を開始するが、早期にLDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には5mgより投与を開始してもよい。なお、年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは増量後、4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次10mgまで増量できる。10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない、家族性高コレステロール血症患者などの重症患者に限り、さらに増量できるが、1日最大20mgまでとする。

10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

11. 再審査期間

該当しない

12. 投薬期間制限に関する情報

本剤は、投薬期間に関する制限は定められていない。

13. 各種コード

販売名	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	個別医薬品コード (YJコード)	HOT (9桁) 番号	レセプト電算コード
ロスバスタチン錠 2.5mg「科研」	2189017F1111	2189017F1111	126012001	622601201
ロスバスタチン錠 5mg「科研」	2189017F2118	2189017F2118	126013701	622601301
ロスバスタチンOD錠 2.5mg「科研」	2189017F3114	2189017F3114	126014401	622601401
ロスバスタチンOD錠 5mg「科研」	2189017F4110	2189017F4110	126015101	622601501

14. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

XI. 文献

1. 引用文献

- 1) ダイト株式会社 社内資料：安定性に関する資料
- 2) ダイト株式会社 社内資料：溶出試験に関する資料
- 3) ダイト株式会社 社内資料：生物学的同等性試験に関する資料
- 4) Schneck DW, et al. *Am J Cardiol.* 2003 ; 91(1) : 33-41 (PMID : 12505568)
- 5) アトルバスタチンとの用量反応比較試験
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要ト 1.3.2)
- 6) 日本人高コレステロール血症患者における有効性, 2002
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要ト 1.2.3)
- 7) 外国人高コレステロール血症患者における有効性, 2001
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要ト 2.1.2.1)
- 8) 外国人高コレステロール血症患者の長期投与における有効性, 2001
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要ト 1.5.2)
- 9) Olsson AG, et al. *Am Heart J.* 2002 ; 144(6) : 1044-1051 (PMID : 12486429)
- 10) Mabuchi H, et al. *J Atheroscler Thromb.* 2004 ; 11(3) : 152-158 (PMID : 15256766)
- 11) ヘテロ接合体性 FH 患者における増量、長期投与試験
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要ト 1.4.2)
- 12) Nezasa K, et al. *Xenobiotica.* 2003 ; 33(4) : 379-388 (PMID : 12745873)
- 13) 作用機序のまとめ
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.2.8)
- 14) McTaggart F, et al. *Am J Cardiol.* 2001 ; 87(5A) : 28B-32B (PMID : 11256847)
- 15) LDL 受容体に対する作用, 2002
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.2.3)
- 16) イヌの血中脂質に対する作用, 2002
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.1.1)
- 17) カニクイザルの血清コレステロール及びリポ蛋白コレステロールに対する作用, 2002
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.1.2)
- 18) WHHL ウサギの血清コレステロール及び動脈硬化病変に対する作用, 2002
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.1.3)
- 19) アポ蛋白 E*3Leiden トランスジェニックマウスに対する作用, 2002
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.1.4)
- 20) ヒトアポ蛋白 B/CETP トランスジェニックマウスに対する作用, 2002
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.1.5)
- 21) 単回投与後の血漿中濃度, 1996
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.3.1.2)
- 22) Martin PD, et al. *Clin Ther.* 2003 ; 25(8) : 2215-2224 (PMID : 14512129)
- 23) 反復投与後の血漿中濃度, 2001
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.4)
- 24) 反復投与後の血漿中濃度
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要イ 3.2.2.2)
- 25) 患者における血漿中濃度, 2002
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.6)
- 26) 患者における反復投与時の血漿中濃度
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.7.8)
- 27) Martin PD, et al. *Br J Clin Pharmacol.* 2002 ; 54(5) : 472-477 (PMID : 12445025)
- 28) 食事の影響, 2000
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.7.5)
- 29) 薬物相互作用－制酸剤, 2000
(クレストール錠：2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.7.12.2(f))
- 30) Simonson SG, et al. *Clin Pharmacol Ther.* 2004 ; 76(2) : 167-177 (PMID : 15289793)
- 31) Schneck DW, et al. *Clin Pharmacol Ther.* 2004 ; 75(5) : 455-463 (PMID : 15116058)
- 32) Cooper KJ, et al. *Eur J Clin Pharmacol.* 2002 ; 58(8) : 527-531 (PMID : 12451430)

- 33) Cooper KJ, et al. Br J Clin Pharmacol. 2003 ; 55(1) : 94-99 (PMID : 12534645)
- 34) Cooper KJ, et al. Clin Pharmacol Ther. 2003 ; 73(4) : 322-329 (PMID : 12709722)
- 35) Cooper KJ, et al. Eur J Clin Pharmacol. 2003 ; 59(1) : 51-56 (PMID : 12682802)
- 36) Simonson SG, et al. J Clin Pharmacol. 2005 ; 45(8) : 927-934 (PMID : 16027403)
- 37) Martin PD, et al. J Clin Pharmacol. 2002 ; 42(12) : 1352-1357 (PMID : 12463730)
- 38) Simonson SG, et al. Br J Clin Pharmacol. 2004 ; 57(3) : 279-286 (PMID : 14998424)
- 39) McCormick AD, et al. J Clin Pharmacol. 2000 ; 40 : 1055
- 40) ロスバスタチンの *in vitro* 代謝
(クレストール錠 : 2005 年 1 月 19 日承認、申請資料概要へ 3.7.9)
- 41) 生物学的利用率, 2001
(クレストール錠 : 2005 年 1 月 19 日承認、申請資料概要へ 3.5)
- 42) 蛋白結合率, 2000
(クレストール錠 : 2005 年 1 月 19 日承認、申請資料概要へ 2.2.5)
- 43) 尿糞中排泄率, 1999
(クレストール錠 : 2005 年 1 月 19 日承認、申請資料概要へ 3.7.9.5)
- 44) HMG-CoA 還元酵素阻害活性体の血漿中濃度, 2000
(クレストール錠 : 2005 年 1 月 19 日承認、申請資料概要へ 3.7.9.4)
- 45) Martin PD, et al. J Clin Pharmacol. 2002 ; 42(10) : 1116-1121 (PMID : 12362926)
- 46) Simonson SG, et al. Eur J Clin Pharmacol. 2003 ; 58(10) : 669-675 (PMID : 12610743)
- 47) 腎障害の影響, 2001
(クレストール錠 : 2005 年 1 月 19 日承認、申請資料概要へ 3.7.11)
- 48) Zurth C, et al. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2019 ; 44(6) : 747-759 (PMID : 31571146)

2. その他の参考文献

第十八改正日本薬局方解説書 (廣川書店)

XII. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

該当しない

2. 海外における臨床支援情報

(1) 妊婦への投与に関する海外情報

該当しない

(2) 小児等への投与に関する海外情報

該当しない

XIII. 備考

1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報

(1) 粉碎

個別に照会すること

照会先：科研製薬株式会社 医薬品情報サービス室

電話：0120-519-874

受付時間：9：00～17：00

(土、日、祝日、その他当社の休業日を除く)

(2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性

個別に照会すること

照会先：科研製薬株式会社 医薬品情報サービス室

電話：0120-519-874

受付時間：9：00～17：00

(土、日、祝日、その他当社の休業日を除く)

2. その他の関連資料

(1) 患者向け説明用資材

該当資料なし

(2) GS1 コード

販売名	包装	GS1 コード	
		販売包装単位	調剤包装単位
ロスバスタチン錠 2.5mg 「科研」	100 錠 PTP	(01)14987042 466014	(01)04987042 466512
ロスバスタチン錠 5mg 「科研」	100 錠 PTP	(01)14987042 466083	(01)04987042 466611
ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「科研」	100 錠 PTP	(01)14987042 466236	(01)04987042 466710
ロスバスタチン OD 錠 5mg 「科研」	100 錠 PTP	(01)14987042 466304	(01)04987042 466819