


製品別比較表(先発品との比較)

ダイト株式会社

	後発品	標準品		
商品名	ロスバスタチン錠5mg「科研」	クレステール錠5mg		
販売会社名	科研製薬株式会社			
規格「一般名」	1錠中「ロスバスタチン」を5mg含有			
薬効分類	2189 HMG-CoA還元酵素阻害剤			
薬価	20.60円/1錠	36.30円/1錠		
1錠薬価差	15.70円			
効能・効果	高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症 【標準品と同じ】			
用法・用量	通常、成人にはロスバスタチンとして1日1回2.5mgより投与を開始するが、早期にLDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には5mgより投与を開始してもよい。なお、年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは増量後、4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次10mgまで増量できる。10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない、家族性高コレステロール血症患者などの重症患者に限り、さらに増量できるが、1日最大20mgまでとする。 【標準品と同じ】			
添加物	乳糖水和物、リン酸水素カルシウム水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、プロピレングリコール、酸化チタン、カルナウバロウ	乳糖水和物、結晶セルロース、第三リン酸カルシウム、クロスポビドン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、トリアセチン、酸化チタン、黄色三二酸化鉄		
規制区分	処方箋医薬品	処方箋医薬品		
貯法・使用期限	室温保存 3年	室温保存 3年		
製剤	商品名	外観(重量、直径、厚さ)	性状	識別コード
	ロスバスタチン錠5mg「科研」	 158mg 7.1mm 3.6mm	白色から帯黄白色のフィルムコーティング錠	—
標準品	 約0.15g 約7mm 約3.8mm	うすい赤みの黄色からくすんだ赤みの黄色のフィルムコーティング錠		
製剤特性	特になし			
薬物動態(生物学的同等性)	 <p>「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、ロスバスタチン錠5mg「科研」とクレステール錠5mgの生物学的同等性が確認された。</p>			
備考				
担当者、連絡先				