





	後発品	標準品		
商品名	エバスチンOD錠10mg「科研」	エバステルOD錠10mg		
販売会社名	科研製薬株式会社			
規格「一般名」	1錠中「エバスチン」を10mg含有			
薬効分類	449 持続性選択H <sub>1</sub> 受容体拮抗剤			
薬価	23.20円/1錠	48.70円/1錠		
1錠薬価差	25.50円			
効能・効果	蕁麻疹 湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症 アレルギー性鼻炎 <span style="float: right;">【標準品と同じ】</span>			
用法・用量	通常、成人には、エバスチンとして1回5～10mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢・症状により適宜増減する。 <span style="float: right;">【標準品と同じ】</span>			
添加物	D-マンニトール、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスボビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ステビア抽出精製物	D-マンニトール、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、タウマチン、ステアリン酸マグネシウム		
規制区分	—	—		
貯法・使用期限	遮光、気密容器、室温保存 3年			
製剤	商品名	外観(重量、直径、厚さ)	性状	識別コード
	エバスチンOD錠10mg「科研」	 200mg 8.0mm 3.6mm	白色の割線入り素錠	KC78
標準品	 200mg 8.0mm 3.1mm	白色の割線入り素錠		
製剤特性	特になし			
薬物動態 (生物学的 同等性)	<b>血漿中濃度比較試験</b> 水で服用 		<b>溶出試験</b> 溶出試験結果(pH1.2/50rpm) 	
	水なし服用 		溶出試験結果(pH4.0/50rpm) 	
クロスオーバー法により各1錠を絶食単回経口投与し、生物学的に同等と判定された。		両製剤の溶出挙動はいずれの試験液においても同等と判定された。		
備考				
担当者、連絡先				