




	<b>後発品</b>		<b>標準品</b>		
<b>商品名</b>	<b>グリメピリド錠0.5mg「科研」</b>		<b>アマール0.5mg錠</b>		
<b>販売会社名</b>	科研製薬株式会社				
<b>規格「一般名」</b>	1錠中「グリメピリド」を0.5mg含有				
<b>薬効分類</b>	3961 スルホニルウレア系経口血糖降下剤				
<b>薬価</b>	9.80円/1錠		10.10円/1錠		
<b>1錠薬価差</b>	0.30円				
<b>効能・効果</b>	2型糖尿病(ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。)				
	【標準品と同じ】				
<b>用法・用量</b>	通常、グリメピリドとして1日0.5～1mgより開始し、1日1～2回朝または朝夕、食前または食後に経口投与する。維持量は通常1日1～4mgで、必要に応じて適宜増減する。なお、1日最高投与量は6mgまでとする。				
	【標準品と同じ】				
<b>添加物</b>	乳糖水和物、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、デンプングリコール酸ナトリウム、ポビドン、ステアリン酸マグネシウム		乳糖水和物、ポビドン、デンプングリコール酸ナトリウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム		
<b>規制区分</b>	処方箋医薬品		処方箋医薬品		
<b>貯法・使用期限</b>	気密容器、室温保存 3年		室温保存 3年		
<b>製剤</b>	商品名	外観(重量、直径、厚さ)		性状	識別コード
	グリメピリド錠0.5mg「科研」	 40mg 4.5mm 2.1mm		白色の素錠	K4
標準品	 42.5mg 4.5mm 2.0mm		白色の素錠		
<b>製剤特性</b>	特になし				
<b>薬物動態(生物学的同等性)</b>	溶出試験				
	溶出試験結果(pH7.5/50rpm) 				
	グリメピリド錠0.5mg「科研」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、グリメピリド錠1mg「科研」を標準製剤としたとき、溶出挙動に基づき生物学的に同等とみなされた。				
<b>備考</b>					
<b>担当者、連絡先</b>					