





| | 後発品 | 標準品 | | |
|---------------|---|--|--|-------|
| 商品名 | グリメピリド錠3mg「科研」 | アマリール3mg錠 | | |
| 販売会社名 | 科研製薬株式会社 | | | |
| 規格「一般名」 | 1錠中「グリメピリド」を3mg含有 | | | |
| 薬効分類 | 3961 スルホニルウレア系経口血糖降下剤 | | | |
| 薬価 | 10.10円/1錠 | 20.50円/1錠 | | |
| 1錠薬価差 | 10.40円 | | | |
| 効能・効果 | 2型糖尿病(ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。) 【標準品と同じ】 | | | |
| 用法・用量 | 通常、グリメピリドとして1日0.5～1mgより開始し、1日1～2回朝または朝夕、食前または食後に経口投与する。維持量は通常1日1～4mgで、必要に応じて適宜増減する。なお、1日最高投与量は6mgまでとする。 【標準品と同じ】 | | | |
| 添加物 | 乳糖水和物、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、デンプングリコール酸ナトリウム、ポビドン、ステアリン酸マグネシウム、三二酸化鉄 | 乳糖水和物、ポビドン、デンプングリコール酸ナトリウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、黄色三二酸化鉄 | | |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 | 処方箋医薬品 | | |
| 貯法・使用期限 | 気密容器、室温保存 3年 | 室温保存 3年 | | |
| 製剤 | 商品名 | 外観(重量、直径、厚さ) | 性状 | 識別コード |
| | グリメピリド錠3mg「科研」 |  160mg 8.0mm 2.8mm | 微黄白色の片面割線入り素錠 | KC41 |
| 標準品 |  170mg 8.0mm 2.6mm | 微黄白色の片面割線入り裸錠 | | |
| 製剤特性 | 特になし | | | |
| 薬物動態(生物学的同等性) | <p>血漿中濃度比較試験</p>  | | <p>溶出試験</p>  | |
| | クロスオーバー法により各1錠を食後単回経口投与し、生物学的に同等と判定された。 | | 両製剤の溶出挙動はいずれの試験液においても同等と判定された。 | |
| 備考 | | | | |
| 担当者、連絡先 | | | | |

