

ドネペジル塩酸塩OD錠「モチダ」
を適正に服用いただくために

レビー小体型認知症患者さんの ご家族や介護者の皆さまへ

レビー小体型認知症とは >>

大脳皮質に広範なレビー小体があらわれ、進行性の認知障害、幻視や睡眠時の異常行動がみられ、アルツハイマー型認知症に次いで多い認知症疾患です。

レビー小体型認知症では、進行性の認知障害や繰り返し出現する幻視、睡眠行動障害症状、パーキンソン症状が認められます。

服用中にご注意いただくこと >>

■このお薬を服用しているときに、次のような症状が続く場合には、主治医にご相談ください。

- ▶ 軽い吐き気や食欲不振、便が軟らかくなることもある
- ▶ パーキンソン症状が悪くなることもある

ご家族・介護者の皆さまへ

転倒に注意しましょう >>

レビー小体型認知症では、歩行やバランスを保ったりすることが困難となるため、転倒しやすくなり、転倒による骨折で日常生活に支障をきたします。また、立ち上がるときにふらつきやめまいを生じることがあるため注意が必要です。

ドネペシル塩酸塩
OD錠3mg「モチダ」

黄色の錠剤



表面



裏面

(原寸大)

ドネペシル塩酸塩
OD錠5mg「モチダ」

白色の錠剤



表面



裏面

(原寸大)

ドネペシル塩酸塩
OD錠10mg「モチダ」

淡赤色の錠剤



表面



裏面

(原寸大)

このお薬は、水なしでも飲むことができる 口腔内崩壊錠です

- 口の中でだ液をしみこませると崩れるため、だ液又は少量の水で飲み込むことができます。
- 普通のお薬と同じように、水と一緒に飲むこともできます。

注

- 口の中の粘膜から吸収されるお薬ではないため、溶けたあとにはだ液又は水で飲み込んでください。
- 寝たままの状態では水なしで飲まないでください。

服用にあたって>>>

- お薬の量は医師の指示に従ってください。

通常、3mg(黄色の錠剤)から開始し、1~2週間後に5mg(白色の錠剤)になります。さらに4週間以上経過後に10mg(淡赤色の錠剤)になります。症状により5mgまで減量することがあります。



- このお薬は1日1回服用してください。
- 飲み忘れても、次の日に2回分を一度に飲まないでください。
- 過量に飲んでしまった場合は直ちに病院へ連絡してください。
- 医師の指示なしに、服用を中止しないでください。

その他注意点 >>>

- 直射日光、高温、湿気をさけて保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 気になる症状がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

販売

持田製薬株式会社

製造販売元

ダイト株式会社