

メキタジン製剤の報告副作用

ダイト株式会社

製品名	メキタジン錠3mg「わかもと」(販売開始:1990年12月/販売名変更:2018年12月)																																		
有効成分	メキタジン																																		
報告副作用	<p>自社品でのPMDA報告副作用(重篤症例)につきましては下記の通りです。 医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。</p> <p>2024年4月1日現在 報告副作用 2件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>報告年度</th> <th>性別</th> <th>年齢</th> <th>原疾患等</th> <th>被疑薬</th> <th>有害事象</th> <th>併用被疑薬</th> <th>転帰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1999</td> <td>女</td> <td>40歳代</td> <td></td> <td>メキタミン錠3mg (旧販売名)</td> <td>嘔吐</td> <td></td> <td>回復</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2012</td> <td>男</td> <td>30歳代</td> <td></td> <td>メキタミン錠3mg (旧販売名)</td> <td>アナフィラキシー様ショック</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									報告年度	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	有害事象	併用被疑薬	転帰	1	1999	女	40歳代		メキタミン錠3mg (旧販売名)	嘔吐		回復	2	2012	男	30歳代		メキタミン錠3mg (旧販売名)	アナフィラキシー様ショック		
	報告年度	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	有害事象	併用被疑薬	転帰																											
1	1999	女	40歳代		メキタミン錠3mg (旧販売名)	嘔吐		回復																											
2	2012	男	30歳代		メキタミン錠3mg (旧販売名)	アナフィラキシー様ショック																													