

メトレキサート製剤の報告副作用

ダイト株式会社

製品名	メトレキサート錠2mg「ダイト」(販売開始:2018年6月)																									
有効成分	メトレキサート																									
報告副作用	<p>自社品でのPMDA報告副作用(重篤症例)につきましては下記の通りです。 医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。</p> <p>2024年4月1日現在 報告副作用 1件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>報告年度</th> <th>性別</th> <th>年齢</th> <th>原疾患等</th> <th>被疑薬</th> <th>有害事象</th> <th>併用被疑薬</th> <th>転帰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2023</td> <td>女</td> <td>70歳代</td> <td>リウマチ疑い、 腎不全</td> <td>メトレキサート錠 2mg「ダイト」</td> <td>ステイープン ス・ジョンソン 症候群</td> <td>プレドニゾロ ン、葉酸</td> <td>軽快</td> </tr> </tbody> </table>									報告年度	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	有害事象	併用被疑薬	転帰	1	2023	女	70歳代	リウマチ疑い、 腎不全	メトレキサート錠 2mg「ダイト」	ステイープン ス・ジョンソン 症候群	プレドニゾロ ン、葉酸	軽快
	報告年度	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	有害事象	併用被疑薬	転帰																		
1	2023	女	70歳代	リウマチ疑い、 腎不全	メトレキサート錠 2mg「ダイト」	ステイープン ス・ジョンソン 症候群	プレドニゾロ ン、葉酸	軽快																		