

# メトトレキサート錠 2mg「ダイト」 を服用される患者様へ



**【お薬の服用方法】** ※服用日時はお薬のシートにも示されています。

このお薬は服用する「日時」と「量」が決められており、服用しない期間もあります。  
指示どおりに服用しなかった場合、副作用が現れる可能性もありますので、必ずお守りください。

このお薬を、**1週間に合計**            **錠服用**して下さい。

1日目(服用開始日)			2日目		3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
朝	(昼)	夕	朝	(昼) ...					
錠 を服用	12時間 あける	錠 を服用	12時間 あける	錠 を服用	この期間は服用しません(ご注意!)				

- 飲み忘れた場合、忘れた分はとばし(中止)、次に飲む分から決められたとおりに服用してください。決して、別の時刻に飲んだりせず、また一度に2回分を飲まないでください(もし、誤って多く飲んでしまった場合は主治医または薬剤師に連絡してください)。
- 自己判断で服用を中止したり、服用方法や服用量を変更しないでください。(効果発現までに1~2ヵ月を要することがあります)
- 服用中は、できるだけお酒を控えてください。
- 十分な量(コップ一杯以上)の水またはぬるま湯で服用してください。

その他、不明な点、気になる点がありましたら、主治医または薬剤師にご相談ください。

## 【服用中に気をつける主な症状】

服用を始めてから次のような症状がみられたら、直ちに主治医または薬剤師に連絡してください。

### かぜに似た症状

発熱 のどの痛み せき  
息切れ 息苦しい など

### からだ全体の状態

体がだるい 疲れやすい  
食欲不振 下痢 吐き気

### 皮膚症状など

発疹 かゆみ 赤い斑点  
水ぶくれ リンパ腺の腫れ  
出血（皮下、鼻血、歯ぐき）

### その他

むくみ 尿量・尿回数の減少  
頭痛 寝汗 体重減少

このほかにも、気になる症状があれば、主治医または薬剤師にご相談ください。

## 【その他の注意】

- 別の医療機関で受診する場合や、他のお薬を購入する場合は、医師・薬剤師に、このお薬を飲んでいることを必ず伝えて下さい。
- 妊娠中、授乳中の女性は服用しないでください。  
また、このお薬を服用中 および 服用中止後の一定期間は妊娠しないようご注意ください。  
(男性の患者様では、パートナーの女性が妊娠しないようご注意ください)
- このお薬を服用している期間には、生ワクチン [麻疹 (はしか)、風疹、おたふくかぜ、水痘 (みずぼうそう)、BCG、ポリオ (小児まひ) など] の接種はできません。  
接種する必要がある場合は、主治医にご相談ください。
- 治療効果の確認のほか、副作用の早期発見・重症化防止の点からも、定期的に受診してください。