





	後発品	標準品		
商品名	メロキシカム錠10mg「EMEC」	モービック錠10mg		
販売会社名	日医工株式会社			
規格「一般名」	1錠中「メロキシカム」を10mg含有			
薬効分類	114 非ステロイド性消炎・鎮痛剤			
薬価	17.40円/1錠	27.20円/1錠		
1錠薬価差	9.80円			
効能・効果	下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群 【標準品と同じ】			
用法・用量	通常、成人にはメロキシカムとして10mgを1日1回食後に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日最高用量は15mgとする。 【標準品と同じ】			
添加物	クエン酸ナトリウム水和物、クロスポビドン、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース 【標準品と同じ】			
規制区分	劇薬			
貯法・使用期限	室温保存、吸湿注意 3年			
製剤	商品名	外観(重量、直径、厚さ)	性状	識別コード
	メロキシカム錠10mg「EMEC」	 180mg 8.1mm 3.1mm	淡黄白色の素錠 割線あり	EE58,10
標準品	 180mg 8.0mm 2.8mm	淡黄色の割線入り素錠		
製剤特性	特になし			
薬物動態(生物学的同等性)	血清中濃度比較試験 (μg/mL)  <p style="text-align: right;">mean ± S.D. (n=14)</p>		溶出試験 溶出試験結果(pH11.2) 溶出試験結果(pH15.5) 	
	クロスオーバー法により各1錠を絶食単回経口投与し、生物学的に同等と判定された。		両製剤の溶出挙動はいずれの試験液においても同等と判定された。	
備考				
担当者、連絡先				