



2020年9月

使用上の注意改訂のお知らせ

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

日本薬局方 ピタバスタチンカルシウム錠

ピタバスタチンCa錠1mg「科研」

ピタバスタチンCa錠2mg「科研」

ピタバスタチンCa錠4mg「科研」

Pitavastatin Calcium Tab.

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂しましたので、お知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、本改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

■改訂内容（_____：改訂・追記部分）

改訂後		改訂前	
【使用上の注意】 4. 副作用 (2)その他の副作用		【使用上の注意】 4. 副作用 (2)その他の副作用	
頻度	頻度不明	頻度	頻度不明
分類		分類	
過敏症 ^{注1)}	発疹、そう痒、蕁麻疹、紅斑、 <u>血管性浮腫</u>	過敏症 ^{注1)}	発疹、そう痒、蕁麻疹、紅斑
	(省略、変更なし)		(省略)
注1)～注3)：省略 (変更なし)		注1)～注3)：省略	

■改訂理由

同一成分薬の使用上の注意の改訂に伴い、自主改訂により「その他の副作用」の項を改訂いたしました。

- ・ 今回の改訂内容は、「医薬品安全対策情報（DSU）No.292」（2020年9月）に掲載されます。
- ・ 改訂後の添付文書は、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）及び弊社ホームページ（<http://www.kaken.co.jp/medical/index.html>）でご覧いただくことができます。
- ・ 流通在庫の都合により、改訂後の添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数を要しますので、今後のご使用に際しましては、本改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。



発売元
科研製薬株式会社
東京都文京区本駒込2丁目28-8

製造販売元
DAITO ダイト株式会社
富山県富山市八日町326番地